

Informativo

Intradermorreacción

Centro de Alergias

Procedimiento (Tiempo estimado 60 a 90 min):

Para iniciar, la inmunóloga a cargo de su examen realizará un prick test con los medicamentos a testear en su antebrazo, esto consiste en la introducción de distintos alérgenos en la piel del antebrazo, mediante una pequeña punción con lanceta. A los 15 min se evaluará la aparición de pápulas, que nos darán información sobre sensibilización inmediata a los elementos testeados.

Posteriormente, según evaluación médica se administrará pequeñas cantidades de los medicamentos diluidos a testear en su antebrazo (de forma intradérmica), generando pápulas que serán medidas según de forma inmediata y a los 15 min.

Indicaciones

- Traer carnet y orden médica el día del examen (obligatorio)
- Firmar consentimiento informado al inicio del examen.
- No aplique cremas ni emulsiones en sus brazos el día del examen.
- Contar con al menos 7 días de suspensión de antialérgicos, descongestionantes o jarabes para la tos y 3 semanas de corticoides (Revise listado de medicamentos).
- Si usted está tomando un medicamento y desconoce de qué tipo es, consulte en el servicio.

Resultado

El informe estará disponible en 2 días hábiles a partir de las 12:00 hrs; solicitándolo presencialmente a secretarías del servicio.

Nota

Este examen no constituye un diagnóstico de alergia; asista a consulta con su médico tratante para recibir las indicaciones de tratamientos.