

Informativo

Parche de Leches

Centro de Alergias

Test de parche

Evalúa respuestas de sensibilización retardada; por lo que requiere de control a las 48 y 72 horas, posterior a la instalación.

Día 1 (Tiempo estimado de 1 hr):

- Instalación de parche: Se disponen los alérgenos a testear en cámaras metálicas que serán adheridas en su espalda, reforzadas con tela Micropore. De ser necesario, usted puede reforzar en la casa, utilizando idealmente la misma tela.
- No debe despegar el parche y volver a colocarlo, no debe realizar deporte ni actividades que aumenten la sudoración, tampoco debe mojar su espalda hasta el término del examen.

Día 2 (48 hrs/ tiempo estimado 45 min):

- Retiraremos el parche y marcaremos su espalda con lápiz hipoalérgico; posteriormente deberá esperar 30 min para la 1ra revisión de su espalda.

Día 3 (72 hrs / tiempo estimado 20 min):

- Se realiza la última revisión de su espalda, con lo que finaliza el examen. Ya puede mojar su espalda nuevamente.

Los alérgenos a testear son: Leche de vaca, soya, cabra, Nan HA, Althera, Humana Plus 1, Humana Plus HA 2, S 26, Similac Total Comfort 1y2, Humana expert AT1 y Caseina. Pudiendo incluir leche materna u otra presentación comercial que el médico indique en orden médica, la cual debe ser proporcionada por el paciente.

Indicaciones

- Debe asistir con carnet y orden médica (Obligatorio)
- No debe aplicar jabón ni cremas en los antebrazos ni en espalda el día del examen.
- Debe suspender antihistamínicos por 7 días y corticoides por 3 semanas (Revisar listados)
- Si el paciente toma leche materna, la madre deberá suspender 2 días antes del examen el Sulpivol o Sulpilan.
- El día del examen, el paciente debe estar clínicamente estable, es decir, sin ningún cuadro infeccioso ni fiebre.

Resultado

El informe estará disponible en 2 días hábiles a partir de las 12:00 hrs; solicitándolo presencialmente a secretarías del servicio.

Nota

Un resultado positivo, no constituye un diagnóstico de alergia, por lo que los resultados y tratamientos deben ser indicados por su médico tratante.